Zytomegalie - Seroprävalenz bei schwangeren Erzieherinnen und Blutspenderinnen

Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin
Jahrestagung 2015
Steyr

Dr. Johanna Stranzinger
Grundlagen der Prävention und Rehabilitation
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
Hauptverwaltung Hamburg

Agenda

1

Zytomegalie – kurze Einführung

2

CMV – Epidemiologie und Infektionswege

3

Nationale und internationale Daten (KiTas)

4

Neuere Daten (KiTas, Blutspenderinnen)

CMV: Was kann das Humane Herpesvirus (HHV 5)

Primärinfektion: Erstinfektion

Inkubationszeit 4-8 Wochen

Sekundärinfektion: Zweitinfektion, Reaktivierung

Meist asymptomatisch?

Ähnlich Grippe oder Mononukleose

Lebensbedrohliche Verläufe nach Organtransplantation
(HIV, Epstein Barr-Virus-Infektion)

Embryo-Fetopathien!

CMV: HHV-5 – Infektionswege allgemein

„Leben retten durch Kussverbot“

KONTAKTINFEKTION, keine Luftübertragung
keine Tröpfcheninfektion

Über Blutspende, Organspende

Über die mütterliche Placenta: pränatal

Schleimhautkontakte:

perinatal, postnatal, sexuell

Urin, Speichel, Muttermilch, Genitalflüssigkeiten

Risikofaktoren: beruflich - konkurrierend

- **beruflich**

Kontakt zu erkrankten Ausscheidern, kindernaher Beruf, Hygienefaktoren

- **konkurrierend**

Sexuelle Aktivität, Anzahl eigener Kinder, Stillen, sozioökonomischer Hintergrund, Hygieneverhalten, Herkunftsland, Alter?

Was kann passieren?

Schädigungsmuster ist abhängig vom Alter der Schwangerschaft

8. Schwangerschaftswoche

28. Schwangerschaftswoche

Weltweite Seroprävalenz von CMV

Abbildung 3: Weltweite Seroprävalenz von CMV. (Bull. WHO 49: 103-6, 1973)

CMV – Allgemeine epidemiologische Schätzungen

CMV – Internationale Serokonversionsstudien

Berufliches Infektionsrisiko

Terry B. Hyde et al. 2010

CMV-Serokonversion bei Beschäftigten in Kindertagesstätten (Hyde et al., 2010)

Publikation	Land	Jahr	CMV SP %	Anzahl Seronegativer/ Serokonvertierter / Serokonversionsrate %
Ford-Jones et al., 1996	Canada	vor 1996	67%	56 Personen/ 7/ 12,5%
Jones et al., 1985	California	vor 1985	50% (42-80%)	55 Personen/ 0/ 0%
Murph et al., 1991	Iowa	vor 1991	38%	82 Personen/ 7/ 7,9%
Bale et al., 1999	Iowa	1991-1994	58%	51 Personen/ 5/ 6,8%
Adler, 1989	Virginia	1986-1988	41%	202 Personen/ 19/ 11%

Weltweite CMV-Seroprävalenz bei Frauen im reproduktiven Alter

CMV-Seroprävalenz bei Beschäftigten in Kindertagesstätten in Europa ab 2000

Publikation	Land	Jahr	Studienpopulation	CMV Seroprävalenz %
Billette de Villemeur et al., 2011	France	2005-7	1. Female DCP N 395 2. Business N 382	69,4% 41,1%
<i>Korndewal et al., 2015</i>	<i>Netherlands</i>	<i>2006-7</i>	<i>Cross sectional population-based study, N 6386</i>	<i>45.6% (native Dutch and Western individuals: 41,5%; Non-Western individuals:76,7%)</i>
Stelma et al., 2008	Netherlands	2000-3	1. DCP N 313 in 66 centers; 2. Students at nurse school N 158	21%-65% (age-related) 1. 50% 2. 31%
Rickevoorsel et al., 2012	Netherlands	2007	1. DCP, N 242 (of 285), 38 centers (y 2008) 2. Population of Amsterdam (y 2004), N 298	73% (European: 57%: Non-European: 96%, 100%)
Kiss et al., 2002	Belgium	1996-7	1. Kindergarten teachers N 211, exposed to children aged 2.5-6y 2. Administrative workers N 283	28,9% (childless women: 16,4% one child or more: 33,7%)

Europa: CMV-Seroprävalenz

Risikoschätzungen für Beschäftigte in KiTas

- Stelma et al., 2008:
Die ersten beiden Berufsjahre weisen für Erzieherinnen insgesamt ein erhöhtes Risiko auf (adj OR = 3.80; $p < 0,001$), auch beruflich (2.19).
- de Villemeure et al., 2011:
Der Anteil des beruflichen Risiko (30%) bewegt sich im Rahmen des privaten Risikos (14,5% - 32,4%). (PR, 1.43 (95% IC, 1.22-1.69)). Ein eigenes Kind (Ehepartner beschäftigt) in der KiTa erhöht das private Risiko (RR 1.48; 1.45) deutlich.
- Rickevoorsel et al., 2012:
Erzieherinnen mit europäischer Abstammung weisen ein erhöhtes Risiko auf (1.7 95% CI 1.3-2.3).

Deutschland: noch keine Daten für Beschäftigte in KiTas bekannt – Risiko?

- HH: Großlabor Fenner Hamburg
- Schwangere aus dem Labor Enders, mittlerer SES vor 2009
- HH: Schwangere Erzieherinnen 2010-13
- HH: Blutspenderinnen 2010-13

CMV – Seroprävalenz in Hamburg in 2012

CMV-Seroprävalenz Hamburg

52%

1106 von 2114 Seren positiv
352 grenzwertige Seren als negativ gewertet
Zahlen 2012 - Labor Dr. Fenner & Ko.

LABOR DR. FENNER UND KOLLEGEN
MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM FÜR LABORMEDIZIN UND HUMANGENETIK

Vergleich schwangerer Erzieherinnen mit Hamburger Blutspenderinnen (2010-13)

Seroprävalenz schwangerer Erzieherinnen (n=516) 55%

Seroprävalenz von Erstspenderinnen (n=16270) 43,1%

Vergleich schwangerer Erzieherinnen mit jemals schwangeren Blutspenderinnen

Seroprävalenz bei jemals schwangeren Erstspenderinnen (n 2780) 54,8%

Seroprävalenz bei schwangeren Erzieherinnen (n 516) 55%

Epidemiologische Vergleiche

Mittlere Seroprävalenz (CMV-IgG-AK pos.)

- **55%, HH/ Schwangere Erzieherinnen, 2010-13**
- **55% HH/ Bluterstspenderinnen, die schon einmal schwanger waren, 2010-13**
- *52% HH: Laborkollektiv City-Labor 2012*
- *46% Schwangere, mittlerer SES vor 2009, Laborkollektiv Enders*
- *43% HH: alle Bluterstspenderinnen, 2010-13*

Prävention – für KiTas

Allgemeine Hygieneregeln

- kein direkter Urin- und Speichelkontakt
- keine gemeinsame Benutzung von Gegenständen und Handtüchern
- kein gemeinsamer Genuss von Nahrungsmitteln

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

johanna.stranzinger@bgw-online.de